

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)**

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 28, ημερομηνίας 20/12/2012 για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με το διανομέα,

τροποποιείται ως ακολούθως η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FOSBEL 80WP** με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2936

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

03/08/2012

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/04/2017

2. Κάτοχος της άδειας:

Probelte S.A
Ctra Madrid, Km 386.6
Polígono Industrial El Tiro
30100 Espinardo
Murcia - Spain

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον

κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

1. L. Lambrou Agro Ltd
2. Cygro Ltd
3. A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd

B) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Fosbel 80WP

2. Μορφή: Βρέξιμη σκόνη (WP)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
fosetyl Al 80% β/β
βοηθητικές ουσίες 16,7% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Probelte S.A., Ισπανία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Probelte S.A., Ισπανία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Probelte S.A., Ισπανία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	25γρ., 50γρ., 100γρ.(4x25), 150γρ., 200γρ., 250γρ., 300γρ., 350γρ., 400γρ., 450γρ., 500γρ., 550γρ., 600γρ., 750γρ., 800γρ., 1Kg, 2,5Kg, 5Kg	Σακούλα Polythylene Al και κουτί χάρτινο
2	Σακίδιο	25γρ., 50γρ., 100γρ.(4x25), 150γρ., 200γρ., 250γρ., 300γρ., 350γρ., 400γρ., 450γρ., 500γρ., 550γρ., 600γρ., 750γρ., 800γρ., 1Kg, 2,5Kg, 5Kg	Σακούλα σύνθετου υλικού Polythylene Al/Polyester

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: fosetyl Al

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 96%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Fosetyl Al Task Force - INDUSTRIAS AFRASA SA, Ισπανία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:
1) Hangzhou march Chemical Laboratory, Κίνα
2) Shandong Dacheng Pesticide Co., Ltd Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να αναδευτεί καλά πριν την έναρξη του ψεκασμού.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
Εσπεριδοειδή	Φυτόφθορα (<i>Phytophtora spp</i>)	250-300	100-150	250-450	3 ψεκασμοί. 1 ^{ος} στην αρχή της άνοιξης, 2 ^{ος} τον Ιούλιο και ο 3 ^{ος} τον Οκτώβρη – Νοέμβρη	3
Μηλιά, Αχλαδιά	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (<i>Phytophtora spp</i>)		80-120	200-360	3 ψεκασμοί. Ο 1 ^{ος} τον Απρίλιο, ο 2 ^{ος} τον Ιούλιο και ο 3 ^{ος} το Σεπτέμβρη – Οκτώβρη	
Αμπέλι (οινοποιίσμιο)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)		30-110	75-330	Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εφόσον οι συνθήκες ^{**} είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας	4

Παρατηρήσεις:

- Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων
- * Σε φυτά με μεγάλη προσβολή όπου το φύλλωμα δεν μπορεί να απορροφάει το ψεκαστικό υγρό συνίσταται η εφαρμογή του προϊόντος με πινέλο πάνω στα προσβεβλημένα μέρη του κορμού και των κλαδιών.
- ** Συνίσταται ο συνδυασμός του με μυκητοκτόνα επαφής για να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά στους ψεκασμούς μετά την άνθηση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Εσπεριδοειδή	15
Μηλιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	28

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 33

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

Μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα που περιέχουν mancozeb, σε μορφή βρέξιμης σκόνης. Δεν συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα και με αζωτούχα διαφυλλικά λιπάσματα. Σε περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με παραφινικό λάδι, το προϊόν πρέπει να εφαρμοστεί, μετά από τουλάχιστον μία εβδομάδα.

11. Σήμανση φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

12. Φράσεις κινδύνου:

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

13. Φράσεις ασφάλειας:

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
- S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια
- S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
«Κατά την εφαρμογή σε οπωρώνες συνιστάται η χρήση τρακτέρ με κλειστή καμπίνα»
- S61** Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- Γενικά: Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και διατηρήστε τον ζεστό σε ανάπταυση. Συμβουλευθείτε γιατρό.
- Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: 21/12/2012

(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα